

MINISTÈRE de l'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DU LANGUEDOC - ROUSSILLON
MONTPELLIER - 16, rue de la République - Tél. 72.58.72

3ème année

N°
N° 15

7 mai 1955

Quatrième édition régionale n° 1

AVERTISSEMENTS

Zone IV

CARPOCAPSE

Des éclosions en cage se produisent depuis une semaine, et les premiers papillons ont été capturés dans certains vergers; par ailleurs les températures crépusculaires sont favorables à l'accouplement et à la ponte. Nous recommandons en conséquence d'effectuer un premier traitement qui devra être achevé le 20 mai au plus tard.

- Utiliser : - Arséniate de plomb + mouillant à 0 kg.5 d'huile blanche d'été (sauf dans les jardins et prés-vergers)
- Produits renfermant 50% de D.D.T.
- Emulsion de D.D.T.
- Oléoparations
- Parathions.

TAVELURE

Il convient de renouveler la protection des organes verts qui se sont développés de telle façon qu'ils ne sont plus protégés par la dernière pulvérisation.

Traitement à terminer avant le 20 mai.

Ce traitement sera associé au traitement destiné à combattre le Carpocapse, selon les possibilités de mélange entre les produits utilisés.

INFORMATIONS

ARAIGNEES ROUGES

Contre les araignées rouges que l'on observe en quantité dans certains vergers, utiliser des produits à base de parathion ou à base de déméton.

OIDIUM DU POMMIER

Les vergers contaminés doivent à nouveau recevoir un traitement avec :

- Bouillie sulfocalcique
- Soufre micronisé
- Soufres dispersés.

Ce traitement est efficace contre la tavelure.

AVIS A NOS ABONNES - Il est rappelé que l'indication de zone est portée à droite de l'adresse.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,
P. BERVILLE

12 MAI 1955

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,
L.L. TROUILLON

785